



INSTRUCCIONES PRE-OPARATORIAS

SOBRE EL DIA PEDIATRICO

Su niño/a ha recibido sedación oral para su tratamiento dental y es muy importante que usted los vigile cuidadosamente. Su niño/a también ha recibido anestesia local. Por favor de tener cuidado con su niño/a de que no se muerda los labios, lengua, o cachets por las próximas dos horas.

Su niño/a puede experimentar cualquiera de los siguientes:

- Alerto en un minuto, somnolencia o sueño al minute siguiente. La somnolencia puede durar 4-8 horas.
- Mareos y/o la falta de coordinación
- Irritabilidad ocasional durante todo el día
- Falta de apetito por unas horas
- Náuseas y/o vómitos
- Problemas de sueño, incluyendo pesadillas, incapacidad para dormir a la hora de acostarse o miedo al dormir.

Regresando a casa:

- El niño/a debe ser colocado en un cinturón de seguridad sea conveniente asiento dependiendo de edad en el coche en el asiento trasero.
- Un miembro responsable de familia debe sentarse al lado del niño/a.
- Si su hijo/a duerme en el coche, mantenga la cabeza hacia adelante sobre su pecho.
- Reclinar a su hijo/a puede ayudar.

Descanso y la actividad:

- Permita que su hijo/a descanse.
- Estar seguro de que alguien está con él/ella en todo momento. EVITAR ALMOHADAS O COBIJAS.
- Preste mucha atención a los niños/a que son más activos.
- Evite todas las actividades como nadando, montar bicicleta, gimnasia, subir o bajar escaleras durante 24 horas.
- Supervise a sus hijo/a durante las siguientes 24 horas.

Beber y Comer:

- No alimente a su niño/a hasta que él/ella está completamente despierto.
- Primero comience a alimentar con líquidos, "libre de pulpa" y que no sean carbonatados.
- Evitar los productos lácteos durante 24 horas. Si su niño/a ha tolerado líquidos, puede alimentar alimentos semi-sólidos como: arroz, sopa, fideos, etc.
- Se el niño/a vomita, deje de alimentarlo/a durante 30-60 minutos y luego gradualmente reanudar líquidos.

El Tratamiento del dolor y la fiebre:

- Evitar los medicamentos que contengan aspirina.
- Use **CHILDREN'S TYLENOL, CHILDREN'S MOTRIN OR CHILDREN'S ADVIL**. Sig las instrucciones de dosis cuidadosamente en la botella y no se exceda.
- Evite cepillarse los dientes el día de la cirugía. El próximo día limpie suavemente la boca con un cepillo de dientes suave.
- La inflamación puede ocurrir. Aplicar un paño frío en el área inflamada durante unos 20 minutos. Si la inflamación aumenta después de 48 horas hable a nuestra oficina!
- Hematomas en la piel alrededor de la boca puede ocurrir después de la cirugía y puede durar aproximadamente una semana.
- Dolor de garganta, dificultad para abrir la boca o dolor de oído a veces se producen después del tratamiento dental bajo sedación. Esto debería comenzar a desaparecer poco a poco en 2-4 días.

CUANDO LLAMAR AL MEDICO:

**Problemas respiratorios
Náuseas o vómitos frecuentes**

**Prolongada debilidad y/o somnolencia
Sangrado prolongado, dolor intenso o hinchazón**

Si no pueden comunicarse con TEXAS ALLSMILES at 281-286-3838 o a nuestra línea de después de horas a 281-520-8118: y si usted siente que tiene una verdadera emergencia, llama al 9-1-1 o ir a la sala de emergencia más cercana.

803 E. Nasa Prkwy #120
Webster, Texas 77598

3828 Hughes Court #106
Dickinson, Texas 77538

8200 Wednesbury Lane #108
Houston, Texas 70074